

Indicaciones:

Tabla 1. Condiciones Médicas que pueden requerir de un traslado en ambulancia aérea.

- Emergencias o problemas neurológicos, vasculares, quirúrgicos, o cardíacos agudos que requieran intervenciones tempranas.
- Condiciones Críticas en pacientes con compromiso hemodinámico o respiratorio.
- Condiciones Críticas en pacientes obstétricos que su tiempo de traslado requiere ser minimizado para prevenir complicaciones en el paciente o en el feto.
- Condiciones Críticas en pacientes Neonatales o Pediátricos con compromiso hemodinámico o respiratorio, acidosis metabólicas de más de 2 horas después del parto, sepsis o meningitis.
- Trastornos Electrolíticos y exposición a Tóxicos que requieren intervenciones inmediatas no disponibles en el sitio de atención.
- Falla orgánica que requiera trasplante.
- Condiciones que requieran tratamiento hiperbárico.
- Quemaduras de más del 40% de Superficie Corporal.
- Politraumatismos que potencialmente pongan en peligro la vida o la pérdida de una extremidad incluyendo lesiones penetrantes de globo ocular.

Contraindicaciones:

Tabla 2. Contraindicaciones absolutas a la Evacuación Aéromédica.

- Condiciones meteorológicas adversas que pongan en riesgo la seguridad del vuelo como determine el Piloto al mando.
- Enfermedad terminal del paciente, a menos que la familia decida realizar el traslado.
- Enfermedades infectocontagiosas o contaminación en fase transmisible.
- Pacientes combativos que no se puedan sedar y pongan en riesgo a la aeronave o a la tripulación.

Contraindicaciones Relativas a la evacuación Aeromédica.

- Paro Cardio-respiratorio.
- Neumotórax, no resuelto con tubo pleural.
- Enfermedad por descompresión (Ej. Accidentes de Buceo).
- Embolismo Arterial
- Obstrucción Intestinal de cualquier índole (comúnmente después de cirugía).
- Vólvulos Intestinales.
- Intususcepción.
- Laparotomía o Toracotomía dentro de los 3 días anteriores.
- Presencia de Aire en cavidad intracraneal.
- Cirugía Ocular dentro de los 10 días posteriores.
- Gangrena Gaseosa.
- EVC hemorrágico.
- Anemia severa no corregida (Hemoglobina menor a 7g/ml).
- Hemorragia aguda con hematocrito menor a 30%.
- Arritmias severas no controladas.
- Embarazo con parto intermitente.

 **Jet Rescue**
Worldwide Critical Care Air Ambulance